

神召會禮拜堂預防流感措施

風險評估級別	整體情況	應變措施
低	<ul style="list-style-type: none"> ● 香港境外證實爆發高致病性流感或 ● 香港境內證實出現人類感染高致病性流感的個案，但無證據顯示病毒容易在人與人之間傳播或 ● 香港衛生防護中心之政府流感大流行應變系統中級別為戒備或嚴重應變級別 	<ul style="list-style-type: none"> ● 注意個人衛生 ● 日常清潔程序
中	<ul style="list-style-type: none"> ● 有證據確定外地或本港出現容易在人與人之間傳播的新型流感或 ● 香港衛生防護中心之政府流感大流行應變系統中級別為緊急應變級別或 ● 由世衛發出的流感大流行的宣告 	<ul style="list-style-type: none"> ● 應變小組運作，成員包括教牧部、常務委員會、招待部、兒童事工部和工務及保安部之成員代表 ● 對會眾報告最新情況及要求會眾如確診新型流感必須向教會報告 ● 聚會如常進行 ● 為會眾量度體溫，不過必須注意部分患者基於各種因素，可能不會發燒，所以體溫檢查並不能杜絕呼吸道疾病傳播 ● 兒童聚會設有個人登記，保留參與者的詳細資料和聯絡方法，如果日後政府有需要追查病源和接觸者，便能及時取用 ● 留意政府就公共衛生及公眾活動的宣布因應活動性質（例如設有個人登記），保留參與者的詳細資料和聯絡方法，如果日後政府有需要追查病源和接觸者，便能及時取用 ● 正確保養及清潔通風系統，經常進行換氣程序 ● 活動前後以1比99稀釋家用漂白水（即一份5.25%家用漂白水混入99份清水）消毒場地，再以清水沖洗及抹乾／拖乾 ● 上述消毒程序應最少於即將活動前進行一次，以及活動後立即進行

		<ul style="list-style-type: none">● 活動時保持場館清潔。定期用1比99稀釋家用漂白水消毒場地，如弄髒環境或場地，則須加強清潔● 常備衛生設施，例如在出入口及合適的地點設置有70-80%酒精搓手液的自助消毒機，並確保有足夠庫存和運作正常● 常備梘液、即棄式抹手紙或乾手機於洗手間● 確保場地有足夠垃圾箱，並須經常清理● 如任何物件被嘔吐物、痰涎或其他分泌物污染，應立即用1比49稀釋家用漂白水（即一份5.25%家用漂白水混入49份清水）消毒。待15至30分鐘後以清水沖洗及抹乾● 在活動場地入口及會場標示「預防呼吸道傳染病的健康指引—給參與公眾活動者」《附件一》● 在活動場地入口及會場標示「正確使用口罩」《附件二》● 為免人數過多，控制場地可容納的人數及實施人流控制措施● 如要提供食物，場地須設有足夠衛生設施，例如酒精搓手液和洗手設施● 用清潔的食具處理食物● 可供應獨立包裝食物● 妥善貯存及蓋好食物、飲品以及食具● 指示員工在運送食物時蓋好食物● 員工在處理食物時，應戴上口罩和即棄式手套● 提醒參與者在進食前正確潔手● 提醒參與者及員工妥善棄置垃圾● 留意員工的健康狀況● 員工若有呼吸道感染徵狀，例如咳嗽和流鼻水，應佩戴口罩，並立即就醫。患者不應上班● 勸喻有發燒或有咳嗽和流鼻水等呼吸道感染徵狀的參與者不要參與活動。患者應立即戴上口罩和就醫● 證實感染人類豬型流感《甲型流感H1N1》及並未全癒之人仕請勿出席活動● 證實感染甲型流行性感冒《H3N2》及並未全癒之人仕請勿出席活動● 有發熱病徵及有喉嚨痛或咳嗽或流感病徵者並無求診人仕請勿出席活動● 有發熱病徵及有喉嚨痛或咳嗽或流感病徵者經醫生診治後並已退燒，由退燒病及無徵後起計7日後才可出席活動
--	--	---

<p>高</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 已有證據確定有會友(曾到教會)或教牧同工確診新型流感 	<ul style="list-style-type: none"> ● 加強防感染措施及加強清潔《程序與中度風險評估級別相同》及 ● 加強應變小組指揮及協調各部門之防感染工作 ● 聚會如常進行，15 人以上之聚會建議會眾帶口罩 ● 兒童崇拜及 Awana 聚會必須帶口罩 ● 建議會眾減少親密接觸 ● 聯絡衛生防護中心尋求指引 ● 由受感染新型流感《人類豬型流感》會眾或同工全癒後起計 7 日後，如無新增個案才由應變小組決定把措施減低
-----------------	--	---

註：應變小組有權按實際情況而修改以上之指引，請參加者留意報告

Version : 2009-08-08

預防呼吸道傳染病的健康指引—給參與公眾活動者

要預防呼吸道傳染病，衛生署建議市民於參與公眾活動時注意以下各點：

參與活動前：

- 如有不適，尤其是出現發燒及／或有咳嗽、打噴嚏等呼吸道感染病徵時，就不應前往活動，並應盡早找醫生診治。
- 雙手應經常保持清潔，接觸公用物件或設施後應洗手。
- 應隨身帶備手帕或紙巾。

參與活動期間：

- 保持良好個人衛生。打噴嚏或咳嗽時應掩蓋口鼻，並立刻用梘液洗手，以免飛沫傳播細菌或病毒。
- 在觸摸眼睛、口或鼻前、進食前及如廁後都應該洗手。
- 洗手時應以梘液清洗最少二十秒，其後用抹手紙或乾手機弄乾。
- 如沒有洗手設施，在雙手並無可見污漬的情況下，可用 70-80% 酒精搓手液消毒。
- 不要隨地吐痰或亂拋垃圾，痰涎應用紙巾包好，棄置於有蓋的垃圾桶內；垃圾亦應棄置在垃圾桶內。在公眾地方隨地吐痰及亂拋垃圾均屬違法，定額罰款為 \$1,500。
- 不應吸煙。

參與活動後：

- 保持雙手清潔。

- 回家後，應洗澡及洗頭，清除身體上的污垢及細菌。

主辦單位及參與者應時刻留意政府就傳染病爆發的公布，以及採取相應的預防措施。

祝你有一個愉快及精彩的活動！

2009 年 4 月

正確使用口罩

正確使用口罩是預防呼吸道感染傳播的方法之一。凡呼吸道受感染的病者、須要照顧呼吸道受感染病者的人士及進入醫院或診所的人士，都應佩戴口罩，以減低疾病傳播的機會。一般供外科手術使用的口罩，只要佩戴得宜，都有助預防飛沫傳播。



佩戴外科口罩要注意的事項：

佩戴口罩前，以及脫下口罩前後都必須洗手。

- 要讓口罩緊貼面部：
 - 口罩有顏色的一面向外，有金屬片的一邊向上。
 - 繫緊固定口罩的繩子，或把口罩的橡筋繞在耳朵上，使口罩緊貼面部。
 - 口罩應完全覆蓋口鼻和下巴。
 - 把口罩上的金屬片沿鼻樑兩側按緊，使口罩緊貼面部。
- 佩戴口罩後，避免觸摸口罩，以防減低保護作用。若必須觸摸口罩，在觸摸前、後都要徹底洗手。
- 脫下口罩時，應盡量避免觸摸口罩向外部分，因為這部分可能已沾染病菌。
- 脫下口罩後，放入膠袋或紙袋內包好，再放入有蓋的垃圾桶內棄置。
- 外科口罩應最少每天更換。口罩如有破損或弄污，應立即更換。

